

农药登记证号:WP20130065
农药生产许可证(或生产批准文件)号:
产品标准号:

虫螨腈

有效成分含量:240克/升

剂型:悬浮剂



中等毒

使用技术和使用方法:

作物(或范围)	防治对象	制剂用药量	使用方法
木材	白蚁	2毫升/平方米	涂抹或浸渍
土壤	白蚁	25-50毫升/平方米	喷洒

(注:(1)公顷用制剂量=亩用制剂量×15

(2)总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数)

1.须按标签中说明使用。2.由专业人员使用。3.土壤处理:将本品按照100-200倍稀释(0.125-0.25%)后,对需处理土壤喷洒或灌注处理。每平方米使用稀释药液4-5升。4.木材处理:将本品按照100倍稀释(0.25%)后,每平方米涂刷至少200毫升稀释药液,或置于药液中浸泡至少6小时。

生产企业名称:巴斯夫欧洲公司

产品性能(用途):

1.本品用于土壤及木材中白蚁的防治。2.虫螨腈是一种新型吡咯类杀虫剂,具有胃毒作用,兼具触杀活性。3.虫螨腈为非驱避性白蚁防治剂。

注意事项:

1.使用本品时应穿戴防护服和手套,避免药液接触皮肤或眼睛。在药液干燥前,请不要未穿防护衣进入处理区域。2.施药期间不可吃东西、饮水和吸烟。3.施药后应及时洗手和洗脸。4.远离水产养殖区施药,禁止在河塘等水体中清洗施药器具,蚕室及桑园、河塘等水域附近禁用。5.过敏者禁用,使用中有任何不良反应请及时就医。6.一旦有药液溅出,用泥土或吸收材料吸收。毁掉空包装袋,并按照当地有关规定处置所有的废弃物。7.使用过的药械需清洗三遍,在洗涤药械或处置废弃物时不要污染水源。8.孕妇和哺乳期妇女禁止接触。

中毒急救:

1.中毒症状:过量误服,可导致腹泻发生。2.不慎将药剂接触皮肤或眼睛,立即用肥皂和大量清水冲洗至少15分钟,或请教内科医生。3.不慎吞服,勿催吐,应携此标签立即请医生诊治。4.医生使用:此化合物没有特殊的解毒药,误服的治疗应该控制中毒症状及临床状况。因为误将芳香烃溶剂吸入肺中,会增加化学肺炎及肺水肿的危险,催吐只能在专业人员的监督下进行。

储存和运输:

1.本品应贮存在干燥、阴凉、通风、防雨处,并置于儿童不能触及处,并加锁保存。2.保持装有药液的容器密封。3.不要使用装过药液的容器贮存饲料。4.不要存放在阳光直射或高温处。远离热源,明火或火花。5.勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮同运。

其他说明:

注:虫螨腈质量分数:21.4%。原产地: ; 国内办事机构:巴斯夫(中国)有限公司。巴斯夫紧急热线:021-58611199(24小时)

净含量(重量):毫升(克) 生产日期:年月日 批号:有效
期:3年

卫生杀虫剂