

巴斯夫®
伐蚁克®

STEALTH®

产品性能(用途)：

- 本品用于土壤及木材中白蚁的防治。
- 虫螨腈是一种新型吡咯类杀虫剂，具有胃毒作用，兼具触杀活性。
- 虫螨腈为非驱避性白蚁防治剂。

使用技术和使用方法：

作物(范围)	防治对象	用药剂量		使用方法
		有效成分用量	制剂用量	
土壤	白蚁	6.25-12.5克/平方米	25-50毫升/平方米	喷洒
木材	白蚁	2500毫克/千克	2毫升/平方米	涂刷或浸渍

使用说明：

- 须按标签中说明使用。
- 由专业人员使用。
- 土壤处理：将本品按100-200倍稀释(0.125-0.25%)后，对需处理土壤喷洒或灌注处理。每平方米使用稀释药液4-5升。
- 木材处理：将本品按100倍稀释(0.25%)，每平方米涂刷至少200毫升稀释药液，或置于药液中浸泡至少6小时。

注意事项：

- 使用本品时应穿戴防护服和手套，避免药液接触皮肤和眼睛。
- 在药液干燥前，不要未穿防护衣进入处理区域。
- 施药期间不可吃东西、饮水和吸烟。
- 施药后应及时洗手和洗脸。
- 远离水产养殖区施药，禁止在池塘等水体中清洗施药器具。蚕室及桑园、河塘等水域附近禁用。
- 过敏者禁用。使用中有任何不良反应请及时就医。
- 一旦有药液溅出，用泥土或吸收材料吸收。
- 毁掉空包装袋，并按照当地有关规定处置所有的废弃物。

巴斯夫®
伐蚁克®

STEALTH®

农药登记证号：WP20130065

虫 螨 腈
有效成分含量：240克/升
剂型：悬浮剂



中等毒



净含量：**1升**

BASF
We create chemistry

巴斯夫®
伐蚁克®

STEALTH®

- 使用过的药械须清洗3遍，在洗涤药械或处置废弃物时不要污染水源。
- 孕妇及哺乳期妇女禁止接触。

中毒急救：

- 中毒症状：过量误服，可导致腹泻发生。
- 不慎将药液接触皮肤或眼睛，立即用肥皂和大量清水冲洗至少15分钟，或请教内科医生。
- 不慎吞服，勿催吐，应立即携此标签请医生诊治。
- 医生使用：此化合物没有特殊的解毒药，误服的治疗应该控制中毒症状及临床症状。因为误将芳香烃溶剂吸入肺中，会增加化学肺炎及肺水肿的危险，催吐只能在专业人员的监督下进行。

储存和运输：

- 本品应储存在干燥、阴凉、通风、防雨处并置于儿童不能触及处，并加锁保存。
- 保持装有药液的容器密封。
- 不要使用装过药液的容器贮存饲料。
- 不要存放在阳光直射或高温处。远离热源，明火或火花。
- 勿与食品、饮料、饲料等其他商品同贮运输。

巴斯夫紧急热线：021-58611199 (24小时)

原产国：美国 生产企业名称：巴斯夫欧洲公司
国内办事机构：巴斯夫(中国)有限公司
地址：上海市浦东新区江心沙路300号 邮编：200137
电话：021- 20391000 传真：021- 20394800
质量保证期：3年

生产日期及批号：

(Manufacturing Date
& Batch No. :)

